


























DIFESA FRAGOLA

Gowan[®]
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura



PRINCIPALI SOLUZIONI: CALENDARIO FENOLOGICO

AVVERSITÀ o ATTIVITÀ	 PRE-TRAPIANTO	 TRAPIANTO	 SVILUPPO VEGETATIVO	 FIORITURA	 ACCRESCIMENTO FRUTTI	 MATURAZIONE E RACCOLTA
MALATTIE	 Remedier  <small>Anche in fertirrigazione</small>		 POLYVERSUM [®]  <small>Anche in fertirrigazione</small>			
			 Ibisco [®] 			
			 Tioflor <small>WDG</small> 			
			 linea Airone [®] 			
FITOFAGI			 GLORIAI 25 EC		 GLORIAI 25 EC	
			 Forza [®]		 Forza [®]	
			 IMPERO 18 EC			
BIOSTIMOLAZIONE			 INCANTO [®] 			
EFFICIENZA TRATTAMENTI			 MAGO [®]			

FUNGICIDI D'ECCELLENZA PER UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE

POLYVERSUM®



Composizione:

Pythium oligandrum ceppo M1

Avversità: Botrite, Marciumi tellurici

Dose d'impiego: 200-300 g/ha

Intervallo di sicurezza: 0 (zero) gg.

Impiego in campo e serra



REMEDIER®



Composizione:

Trichoderma harzianum + *Trichoderma gamsii*

Avversità: Marciumi radicali

Dose d'impiego: 2,5 kg/ha

Intervallo di sicurezza: 3 gg.

Impiego in campo e serra



AIRONE® PIÙ



Composizione:

Rame ossicloruro 14% + Rame idrossido 14%

Avversità: Vaiolatura, Maculatura, Batteriosi

Dose d'impiego: 300-350 g/hl (2-2,5 kg/ha)

Intervallo di sicurezza: 3 gg.

Impiego in campo



AIRONE® LIQUIDO



Composizione:

Rame ossicloruro 10% + Rame idrossido 10%

Avversità: Vaiolatura, Maculatura, Batteriosi

Dose d'impiego: 350-400 ml/hl

Intervallo di sicurezza: 3 gg.

Impiego in campo



IBISCO® NEW



Composizione:

COS-OGA 1,25% (12,5 g/l)

Avversità: Oidio

Dose d'impiego: 250-750 ml/hl (2,5-3 L/ha)

Intervallo di sicurezza: 0 (zero) gg.

Impiego in serra



TIOFLOR WDG



Composizione:

Zolfo 80%

Avversità: Oidio

Dose d'impiego: 200-500 g/hl

Intervallo di sicurezza: 5 gg.



ALTRE SOLUZIONI PER LA DIFESA DELLA FRAGOLA

Formulato	Composizione	Formulazione	Avversità	Dose	Intervallo di sicurezza
FORZA	Lambda-cialotrina 2,5%	WDG	Afidi Lepidotteri	40-60 g/hl (280-600 g/ha) 80-100 g/hl (560-1000 g/ha)	pieno campo: 7 gg
GLORIAL 25 EC	Deltametrina 2,8% (25 g/l)	EC	Afidi	50 ml/hl (250-500 ml/ha)	pieno campo e serra: 3 gg
IMPERO 18 EC	Abamectina 1,90% (18 g/l)	EC	Acari, Minatrici fogliari	50-100 ml/hl (0,15-1 L/ha)	serra: 3 gg

MAGO®



Aumenta l'efficienza del trattamento

Agrofarmaco coadiuvante speciale tensioattivo, antischiuma e antideriva

Dose d'impiego: 50-150 ml/hl (max 1,5 L/ha)

Ideale in miscela con tutti i fungicidi e gli insetticidi, ad es. AIRONE per migliorare l'efficienza del rame.



INCANTO®



Sviluppa le potenzialità colturali

Biostimolante fogliare a base di alghe ed estratti vegetali con betaine e altri elementi

Dose d'impiego: 150-200 g/hl

Ideale per aumentare la qualità e la quantità delle produzioni ed ottenere un risultato migliore.



Polyversum®: marchio registrato Biopreparaty, prodotti in licenza esclusiva Gowan.
Mago®, Impero®, Incanto®, Ibisco®: marchi registrati Gowan.

Glorial®: marchio registrato Gowan e prodotto originale Isagro Spa.
Airone®, Remedier®: marchio registrato e prodotti originali Isagro Spa.



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

GOWAN ITALIA S.r.l. · Tel. 0546 629911
gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

Gowan
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura