

# DICARZOL: il corretto impiego per un risultato sicuro

**L'impiego di DICARZOL, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta, garantisce un'eccellente efficacia ed affidabilità contro tripidi e acari, per proteggere la produzione e salvaguardare il reddito dell'agricoltore.**

I formulati **DICARZOL 50 SP** e **DICARZOL 10 SP** a base di *formetanate* (un'esclusiva assoluta Gowan Italia) rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dell'Uva da Tavola dagli attacchi precoci di Tripidi e Acari.

L'ottima efficacia di Dicarzol contro le forme mobili (neanidi e adulti) dei tripidi è stata dimostrata nel corso degli anni da numerose prove sperimentali svolte in collaborazione con Enti Ufficiali e Centri di saggio. E molti viticoltori lo utilizzano ormai ogni anno, anche all'interno dei **Disciplinari di Difesa Integrata dell'Uva da Tavola**, ottenendo risultati di piena soddisfazione.

Come previsto dalle indicazioni d'etichetta, Dicarzol deve essere impiegato per il primo

trattamento eradicante nei confronti dei tripidi, **2-3 giorni prima della fioritura e comunque entro e non oltre le primissime fasi della stessa.**

In questo modo l'utilizzo di Dicarzol consente di azzerare la popolazione dei tripidi e di pianificare una strategia di difesa di sicuro successo, in maniera **conforme anche alle più esigenti richieste della filiera distributiva ortofrutticola.**

Inoltre, le prove hanno evidenziato anche **un'eccellente attività collaterale nei confronti degli Acari** (es. Ragnetti rossi ed Eriofidi). I valori di efficacia hanno infatti raggiunto livelli comparabili agli acaricidi specifici.

Dicarzol, quindi, grazie al suo duplice ed

originale meccanismo d'azione e alla sua eccellente ed affidabile attività insetticida (con ottimo potere abbattente e buona persistenza d'azione), può aprire le migliori strategie di controllo dei Tripidi, anche in un'ottica di gestione delle resistenze, per salvaguardare, nel breve e lungo termine, le produzioni di uva da tavola ed il reddito dell'imprenditore agricolo.

Gowan Italia è a disposizione per ulteriori chiarimenti e dettagli a riguardo, al numero telefonico 0546-629911 o via mail: [gowanitalia@gowanitalia.it](mailto:gowanitalia@gowanitalia.it)

Approfondimenti tecnici sul prodotto, sono disponibili sul sito [www.gowanitalia.it](http://www.gowanitalia.it)

## POSIZIONAMENTO TECNICO



Grappoli visibili



Pre-fioritura  
(calipre presenti)



Inizio fioritura  
(10% calipre cadute)



Piena fioritura  
(50% calipre cadute)



Allegagione

Dicarzol<sup>®</sup>

Applicare per il controllo dei Tripidi  
entro e non oltre le primissime fasi della fioritura

consentito max 1 tratt./anno




Danni da Tripide su Uva da tavola

# Dicarzol<sup>®</sup>

## NON SBAGLIA UN COLPO

- Massima efficacia nei confronti delle forme mobili di tripidi e acari
- Strumento fondamentale per la gestione delle resistenze
- Inserito nelle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata dell'uva da tavola



Duplice  
meccanismo  
d'azione



**INSETTICIDA - ACARICIDA**

Dicarzol<sup>®</sup>: marchio registrato Gowan CIS.  
Insetticidi autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione.  
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.  
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

**Gowan<sup>®</sup>**  
**ITALIA**  
l'affidabilità in agricoltura  
[www.gowanitalia.it](http://www.gowanitalia.it)