



DIFESA E NUTRIZIONE: posizionamento ideale

AVVERSITÀ o ATTIVITÀ		PRE-TRAPIANTO o PRE-SEMINA	EMERGENZA	FOGLIE A ROSETTA	FORMAZIONE CESPO	SVILUPPO CESPO	RACCOLTA
MALATTIE	PERONOSPORA				Cimoter[®] Rame wg		
					Sarmox[®] 45 DG oppure Kasko[®] Met		
				linea Airone[®]			
				Ibisco[®]			
	MARCIUMI TELLURICI (fertirrigazione)	Remedier		POLYVERSUM[®] (impiego anche in trattamenti fogliari contro Botrite e Sclerotinia)			
FITOFAGI	LEPIDOTTERI				Astrel[®] wDG		
	AFIDI				Fitopyr[®] 2EC PRO		
	TRIPIDI				Dicarzol[®] 50 SP		
	NOTTUE, ecc.				Glorial[®] 25 EC		
	TERRICOLI	Poker[®] GEO					
BIOSTIMOLAZIONE					Tamarack[®]		
EFFICIENZA TRATTAMENTI					MAGO[®]		

LATTUGA: principali soluzioni per una produzione sostenibile



AIRONE® PIÙ

Rame ossicloruro 14% + Rame idrossido 14%
AVVERSITÀ Peronospora
DOSE D'IMPIEGO 200-400 g/hl (2-2,5 kg/ha)
INTERVALLO DI SICUREZZA 7 gg.
Impiego in campo



IBISCO®

COS-OGA 1,25% (12,5 g/l)
AVVERSITÀ Peronospora
DOSE D'IMPIEGO 500-1000 ml/hl (2,5-3 L/ha)
INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.
Babyleaf in pieno campo e serra



POLYVERSUM®

Pythium oligandrum (ceppo M1) - min. 1x10⁶ UFC/g
AVVERSITÀ Botrite e Marciume del colletto
DOSE D'IMPIEGO 200-300 g/ha
INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.
Impiego in campo e serra



REMEDIER®

Trichoderma asperellum 2% + *T. gamsii* 2% - min. 3x10⁷ UFC/g
AVVERSITÀ Marciumi tellurici
DOSE D'IMPIEGO 2,5 kg/ha
INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.
Impiego in campo e serra



ASTREL® WDG

Bacillus thuringiensis subsp. *kurstaki*, ceppo ABTS 351 54%
AVVERSITÀ Lepidotteri (vedi etichetta)
DOSE D'IMPIEGO 100-200 g/hl (750-1000 g/ha)
INTERVALLO DI SICUREZZA -
Impiego in campo e serra



FITOPYR® 2EC PRO

Piretrine pure 2% (18,61 g/l)
AVVERSITÀ Afidi
DOSE D'IMPIEGO max 160 ml/hl (max 1,28 l/ha)
INTERVALLO DI SICUREZZA 1 gg.
Impiego in campo e serra



Prodotto	Composizione	Avversità	Dose	Impiego	Carenza
AIRONE LIQUIDO	Rame ossicloruro 10% + Rame idrossido 10%	Peronospora	350-400 ml/hl	Pieno campo	7 gg.
CIMOTER RAME WG	Cimoxanil 4,2% + Rame metallo 39,75%	Peronospora, Alternaria, ecc.	200-300 g/hl (1,8-2 kg/ha)	Pieno campo e serra	10 gg.
KASKO MET	Metalaxil 25%	Peronospora	80-200 g/hl (0,8 kg/ha)	Pieno campo	15 gg.
SARMOX 45 DG	Cimoxanil 45%	Peronospora	30-40 g/hl (300-400 g/ha)	Pieno campo	10 gg.
DICARZOL 50 SP	Formetanate 50%	Tripidi	200 g/hl (1 kg/ha)	Pieno campo	entro le 4-6 foglie
GLORIAL 25 EC	Deltametrina 2,8% (25 g/l)	Afidi, Nottue	50 ml/hl (250-500 ml/ha)	Pieno campo	3 gg.
POKER GEO	Lambda-cialotrina 0,4%	Insetti terricoli	10-15 kg/ha	Pieno campo	-



MAGO®

Aumenta l'efficienza del trattamento
 Agrofarmaco coadiuvante speciale
 tensioattivo, antischiuma e antideriva

DOSE D'IMPIEGO 50-150 ml/hl (max 1,5 L/ha)
*Ideale in miscela con tutti i fungicidi e gli insetticidi,
 ad es. AIRONE per migliorare l'efficienza del rame.*



TAMARACK®

Sviluppa le potenzialità colturali

Bioestimolante fogliare a elevato contenuto di aminoacidi
 liberi e peptidi facilmente assimilabili

DOSE D'IMPIEGO 200-300 ml/hl
*Ideale per aumentare la qualità e la quantità
 delle produzioni ed ottenere un risultato migliore.*



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

GOWAN ITALIA S.r.l. · Faenza (RA)
 Tel. 0546 629911 · gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

Gowan
 ITALIA
 l'affidabilità in agricoltura