


# LINEA FRAGOLA

**Gowan**<sup>®</sup>  
ITALIA  
l'affidabilità in agricoltura



## DIFESA E NUTRIZIONE: posizionamento ideale

AVVERSITÀ o ATTIVITÀ	 PRE-TRAPIANTO	 TRAPIANTO	 SVILUPPO VEGETATIVO	 FIORITURA	 ACCRESCIAMENTO FRUTTI	 MATURAZIONE E RACCOLTA
MALATTIE	 <small>Anche in fertirrigazione</small>		 <small>Anche in fertirrigazione</small>			
						
						
						
FITOFAGI						
						
						
BIOSTIMOLAZIONE						
EFFICIENZA TRATTAMENTI						

# FRAGOLA: principali soluzioni per una produzione sostenibile

## POLYVERSUM®



### Composizione:

*Pythium oligandrum* ceppo M1

**Avversità:** Botrite, Marciumi tellurici

**Dose d'impiego:** 200-300 g/ha

**Intervallo di sicurezza:** 0 (zero) gg.

Impiego in campo e serra



## REMEDIER®



### Composizione:

*Trichoderma harzianum* + *Trichoderma gamsii*

**Avversità:** Marciumi radicali

**Dose d'impiego:** 2,5 kg/ha

**Intervallo di sicurezza:** 3 gg.

Impiego in campo e serra



## AIRONE® PIÙ



### Composizione:

Rame ossicloruro 14% + Rame idrossido 14%

**Avversità:** Vaiolatura, Maculatura, Batteriosi

**Dose d'impiego:** 300-350 g/hl (2-2,5 kg/ha)

**Intervallo di sicurezza:** 3 gg.

Impiego in campo



## AIRONE® LIQUIDO



### Composizione:

Rame ossicloruro 10% + Rame idrossido 10%

**Avversità:** Vaiolatura, Maculatura, Batteriosi

**Dose d'impiego:** 350-400 ml/hl

**Intervallo di sicurezza:** 3 gg.

Impiego in campo



## IBISCO®



### Composizione:

COS-OGA 1,25% (12,5 g/l)

**Avversità:** Oidio

**Dose d'impiego:** 250-750 ml/hl (2,5-3 L/ha)

**Intervallo di sicurezza:** 0 (zero) gg.

Impiego in serra



## KASKO® MET



### Composizione:

Metalaxil 25%

**Avversità:** Marciume del colletto

**Dose d'impiego:** 1,5 kg/ha

**Intervallo di sicurezza:** 14 gg.

Impiego in serra

Prodotto	Composizione	Formul.	Avversità	Dose	Impiego	Intervallo di sicurezza
BASIRAM ELITE	Rame metallo 12% (142 g/l)	WDG	Vaiolatura, <i>Phytophthora spp.</i> , <i>Xanthomonas spp.</i> (az. collaterale)	250-320 ml/hl (2,5-3,25 L/ha)	pieno campo	7 gg.
ASTREL WDG	<i>Bacillus th. subsp. kurstaki</i> 54%	WDG	Lepidotteri (vedi etichetta)	90-100 g/hl (550-600 g/ha)	pieno campo	-
FITOPYR 2EC PRO	Piretrine 2% (18,61 g/l)	EC	Tripidi, <i>Drosophila suzukii</i>	max 160 ml/hl (max 1,6 l/ha)	pieno campo e serra	2 gg.
FORZA	Lambda-cialotrina 2,5%	WDG	Afidi Lepidotteri	40-60 g/hl (280-600 g/ha) 80-100 g/hl (560-1000 g/ha)	pieno campo	7 gg.
GLORIAL 25 EC	Deltametrina 2,8% (25 g/l)	EC	Afidi	50 ml/hl (250-500 ml/ha)	pieno campo e serra	3 gg.

## MAGO®



### Aumenta l'efficienza del trattamento

Agrofarmaco coadiuvante speciale tensioattivo, antischiuma e antideriva

**Dose d'impiego:** 50-150 ml/hl (max 1,5 L/ha)

Ideale in miscela con tutti i fungicidi e gli insetticidi, ad es. AIRONE per migliorare l'efficienza del rame.



## TAMARACK®



### Svilupa le potenzialità colturali

Biostimolante fogliare a elevato contenuto di aminoacidi liberi e peptidi facilmente assimilabili

**Dose d'impiego:** 200-250 ml/hl

Ideale per aumentare la qualità e la quantità delle produzioni ed ottenere un risultato migliore.



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

GOWAN ITALIA S.r.l. · Tel. 0546 629911  
gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

**Gowan**  
ITALIA  
l'affidabilità in agricoltura