


LINEA POMODORO

Gowan®
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura



DIFESA E NUTRIZIONE: posizionamento ideale



POMODORO: principali soluzioni per una produzione sostenibile



REBOOT®

Zoxamide 33% + Cimoxanil 33%

AVVERSITÀ Peronospora

DOSE D'IMPIEGO 40-45 g/hl (0,4-0,45 kg/ha)

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.

Impiego in campo



ZOXIUM® 240 SC

Zoxamide 21,8% (240 g/l)

AVVERSITÀ Peronospora, Alternaria

DOSE D'IMPIEGO 0,625-0,75 L/ha + partner

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.

Impiego in campo e serra



DOMARK® 125 PLUS

Tetraconazolo 11,6% (125 g/l)

AVVERSITÀ Oidio, Cladosporiosi

DOSE D'IMPIEGO 0,2-0,36 / 0,4-0,6 L/ha

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.

Impiego in campo



IBISCO®

COS-OGA 1,25% (12,5 g/l)

AVVERSITÀ Oidio, Batteriosi *

DOSE D'IMPIEGO 200-270 ml/hl (2 L/ha)

INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.

Impiego in campo e serra



REMEDIER®

Trichoderma harzianum + Trichoderma gamsii

AVVERSITÀ Marciumi tellurici

DOSE D'IMPIEGO 2,5 kg/ha

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.

Impiego in campo e serra



POLYVERSUM®

Pythium oligandrum (ceppo M1)

AVVERSITÀ Muffa grigia, Marciumi tellurici

DOSE D'IMPIEGO 200-300 g/ha

INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.

Impiego in campo e serra



ASTREL® WDG

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54%

AVVERSITÀ Lepidotteri (vedi etichetta)

DOSE D'IMPIEGO 100-200 g/hl

INTERVALLO DI SICUREZZA -

Impiego in campo e serra



GLORIAL® 25 EC

Deltametrina 2,8% (25 g/l)

AVVERSITÀ Afidi, Nottue, Cimice

DOSE D'IMPIEGO 0,3-0,5 L/ha

INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.

Impiego in campo e serra

* IBISCO: Autorizzazione eccezionale su Pomodoro in pieno campo per il controllo delle Batteriosi **dal 31 marzo al 28 luglio 2025**.

Prodotto	Composizione	Avversità	Dose	Impiego	Carenza
AIRONE LIQUIDO	Rame ossicloruro 10% + Rame idrossido 10%	Peronospora, Batteriosi	1,3-2,4 L/ha	Pieno campo e serra	3 gg.
AIRONE PIU' WG	Rame ossicloruro 14% + Rame idrossido 14%	Peronospora, Batteriosi	1,8-2,5 kg/hl	Pieno campo e serra	da industria: 10 gg. da consumo fresco: 3 gg.
CUNEB	Fosfonato di potassio 54,5% (790 g/l)	Peronospora	2,5 L/ha	Pieno campo	15 gg.
GENKOTSU	Amisulbrom 17,70% (200 g/l)	Peronospora	0,5 L/ha	Pieno campo	7 gg.
KASKO MET	Metalaxyl 25%	Peronospora, Alternaria	0,8 kg/ha	Pieno campo e serra	14 gg.
NABUCCO	Metrafenone 42,37% (500 g/l)	Oidio	0,3 L/ha	Pieno campo e serra	3 gg.
SARMOX 45 DG	Cimoxanil 45%	Peronospora	0,30-0,33 L/ha	Pieno campo	7 gg.
DICARZOL 50 SP	Formetanate 50%	Tripidi	1 kg/ha	Pieno campo e serra	14 gg.
FORZA	Lambda-cialotrina 2,5%	Varie	(vedi etichetta)	Pieno campo	15 gg.
POKER GEO	Lambda-cialotrina 0,4%	Insetti terricoli	10-15 kg/ha	Pieno campo	-
SANMITE 10 SC	Pyridaben 9,69% (100 g/l)	Acari, Mosca bianca	140-200 ml/hl	Serra	3 gg.

MAGO®

Aumenta l'efficienza del trattamento

Agrofarmaco coadiuvante speciale tensioattivo, antischiuma e antideriva

DOSE D'IMPIEGO 50-150 ml/hl (max 1,5 L/ha)

Ideale in miscela con tutti i fungicidi e gli insetticidi, ad es. AIRONE per migliorare l'efficienza del rame.



TAMARACK®

Svilupa le potenzialità colturali

Biostimolante fogliare a elevato contenuto di aminoacidi liberi e peptidi facilmente assimilabili

DOSE D'IMPIEGO 200-300 ml/hl

Ideale per aumentare la qualità e la quantità delle produzioni ed ottenere un risultato migliore.



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

GOWAN ITALIA S.r.l.

Faenza (RA) · Tel. 0546 629911

gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

Gowan
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura