

DICARZOL: il corretto impiego per un risultato sicuro

L'impiego di DICARZOL, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta, garantisce un'eccellente efficacia ed affidabilità contro tripidi e acari, per proteggere la produzione e salvaguardare il reddito dell'agricoltore.

DICARZOL, un'esclusiva assoluta Gowan a base di formetanate, rappresenta una soluzione fondamentale per la protezione dell'Uva da Tavola dagli attacchi precoci di Tripidi e non solo. La recente estensione d'etichetta, infatti, prevede l'impiego anche contro Acari ed Eriofidi.

L'ottima efficacia di Dicarzol contro le forme mobili (neanidi e adulti) di tripidi, acari ed eriofidi è stata dimostrata nel corso degli anni da numerose prove sperimentali svolte in collaborazione con Enti Ufficiali e Centri di saggio. E molti viticoltori lo utilizzano ormai ogni anno, anche all'interno dei **Disciplinari di Difesa Integrata dell'Uva**

da Tavola, ottenendo risultati di piena soddisfazione.

Come previsto dalle indicazioni d'etichetta, Dicarzol deve essere impiegato per il primo trattamento eradicante, **2-3 giorni prima della fioritura e comunque entro e non oltre le primissime fasi della stessa**. In questo modo l'utilizzo di Dicarzol consente di azzerare la popolazione dei parassiti e di pianificare una strategia di difesa di sicuro successo, in maniera **conforme anche alle più esigenti richieste della filiera distributiva ortofrutticola**.

Dicarzol, quindi, grazie al suo duplice ed originale meccanismo d'azione e alla sua

IMPIEGO CONTRO TRIPIDI, ACARI ED ERIOFIDI

eccellente ed affidabile attività insetticida (con ottimo potere abbattente e buona persistenza d'azione), può aprire le migliori strategie di difesa, anche in un'ottica di gestione delle resistenze, per salvaguardare, nel breve e lungo termine, le produzioni di uva da tavola ed il reddito dell'imprenditore agricolo.

Gowan Italia è a disposizione per ulteriori chiarimenti e dettagli a riguardo, al numero telefonico 0546-629911 o via mail: gowanitalia@gowanitalia.it

Approfondimenti tecnici sul prodotto, sono disponibili sul sito www.gowanitalia.it



Danni da Tripide su Uva da tavola

POSIZIONAMENTO TECNICO



Grappoli visibili



Pre-fioritura
(caliptrre presenti)



Inizio fioritura
(10% caliptrre cadute)



Piena fioritura
(50% caliptrre cadute)



Allegazione

Dicarzol 

Applicare entro e non oltre le prime fasi della fioritura

consentito max 1 tratt./anno

Dicarzol



**INSETTICIDA
ACARICIDA**

per il controllo dei tripidi

- Massima efficacia nei confronti delle forme mobili di tripidi e acari
- Strumento fondamentale per la gestione delle resistenze
- Inserito nelle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata dell'uva da tavola



**NON
SBAGLIA
UN COLPO**



Dicarzol®: marchio registrato e prodotto originale Gowan.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Gowan
ITALIA

GOWAN ITALIA S.r.l.
Faenza (RA) - Tel. 0546 629911
gowanitalia@gowanitalia.it
www.gowanitalia.it